

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KELOMPOK DUKUNGAN
SEBAYA (KDS) DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL
(ARV) PADA PASIEN HIV/AIDS (STUDI DI RSUD CILACAP)**

*The Relationship Of Family Support and Peer Support Groups with Compliance with
Antiretroviral (ARV) Treatment in HIV/AIDS Patients (Study at Cilacap Hospital)*

Hasna Afaf Fauziyyah¹, Sodikin², Evy Apriani³

^{1,2,3}Health Science Faculty of Al-Irsyad Cilacap University

Jl.Cerme No.24 Sidanegara Cilacap

ABSTRAK

Peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat dan menyerang hingga populasi umum. Pengobatan untuk pasien HIV/AIDS yang bisa diberikan salah satunya adalah terapi *Antiretroviral* (ARV). Dukungan sosial baik dari keluarga dan kelompok sebaya perlu untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan Antiretroviral (ARV). Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dan kelompok dukungan sebaya (KDS) dengan kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada pasien HIV/AIDS (Studi di RSUD Cilacap). Metode penelitian menggunakan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan jumlah 77 responden. Pengambilan data dengan kuesioner. Analisis data menggunakan uji *Rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada pasien HIV/AIDS di RSUD Cilacap dengan tingkat hubungan yang rendah dan searah ($\rho = 0,258$, $p\text{-value} = 0,023$ ($\alpha = 0,05$)), dan ada hubungan antara dukungan kelompok sebaya dengan kepatuhan pengobatan antiretroviral (ARV) pada pasien HIV/AIDS di RSUD Cilacap dengan tingkat hubungan yang rendah dan searah ($\rho = 0,227$, $p\text{-value} = 0,047$ ($\alpha = 0,05$)).

Kata kunci : *HIV/AIDS, Dukungan Keluarga, Kelompok Dukungan Sebaya, Kepatuhan Pengobatan*

ABSTRACT

The increase in HIV/AIDS cases in Indonesia continues to increase and attack the general population. One of the treatments that can be given to HIV/AIDS patients is antiretroviral therapy (ARV). Social support from both family and peer groups is necessary to increase adherence to antiretroviral (ARV) treatment. The research aims to determine the relationship between family support and peer support groups (KDS) and antiretroviral (ARV) treatment adherence in HIV/AIDS patients (study at Cilacap Regional Hospital). The research method is cross-sectional. The sampling technique was purposive sampling, with a total of 77 respondents. Data collection using questionnaires. Data analysis used the Spearman Rank test. The results of the study showed that there was a relationship between family support and adherence to antiretroviral (ARV) treatment in HIV/AIDS patients at Cilacap Regional Hospital with a low level and unidirectional relationship ($\rho = 0,258$, $p\text{-value} = 0,023$ ($\alpha = 0,05$)), and there was a relationship between peer group support and adherence to antiretroviral (ARV) treatment in HIV/AIDS patients at Cilacap Regional Hospital with a low level of relationship and in the same direction ($\rho = 0,227$, $p\text{-value} = 0,047$ ($\alpha = 0,05$))).

Keywords: *HIV/AIDS, Family Support, Peer Support Groups, Treatment Adherence*