

GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DALAM PEMERIKSAAN HBsAg DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ADIPALA II PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2024

Gema Satriya¹, Resti Ikhdha², Evy Apriani³
^{1,2,3}Health Science Institute Al-Islamiyyah Cilacap
Jl. Cerme No 24 Sidanegara Cilacap

ABSTRAK

Pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil merupakan skrinning untuk pencegahan *mother to child transmission*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Gambaran karakteristik ibu hamil dalam pemeriksaan HBsAg di wilayah kerja Puskesmas Adipala II. Desain Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Besar sampel pada penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling* yang berjumlah 100 responden. Hasil penelitian didapat bahwa Pemeriksaan HBsAg dengan hasil reaktif tertinggi pada ibu hamil usia 26-35 tahun berjumlah 7 responden dan hasil HBsAg non reaktif tertinggi pada ibu hamil usia 26-35 tahun berjumlah 50 responden. Pemeriksaan HBsAg dengan hasil reaktif tertinggi pada ibu hamil berpendidikan SMA/SMK berjumlah 10 responden dan hasil HBsAg non reaktif tertinggi pada ibu hamil berpendidikan SMA/SMK berjumlah 52 responden. Pemeriksaan HBsAg dengan hasil reaktif tertinggi pada ibu hamil tidak bekerja berjumlah 10 responden dan hasil HBsAg non reaktif tertinggi pada ibu hamil tidak bekerja berjumlah 68 responden (68%). Pemeriksaan HBsAg dengan hasil reaktif tertinggi pada ibu hamil multigravida berjumlah 10 responden dan hasil HBsAg non reaktif tertinggi pada ibu hamil multigravida berjumlah 57 responden (57%). Pemeriksaan HBsAg dengan hasil reaktif tertinggi pada ibu hamil trimester I berjumlah 10 responden (10%) dan hasil HBsAg non reaktif tertinggi pada ibu hamil Trimester I berjumlah 61 responden (61%). Ibu hamil dalam pemeriksaan HBsAg yang menunjukkan hasil non reaktif berjumlah 90 responden (90%) dan yang menunjukkan hasil reaktif berjumlah 10 responden (10%).

Kata kunci: karakteristik ibu hamil, pemeriksaan HBsAg

ABSTRACT

HBsAg examination in pregnant women is a screening for the prevention of mother to child transmission. This study aims to examine the characteristics of pregnant women in HBsAg examination in the working area of Adipala II Community Health Center. This study design is descriptive research. The sample size in this study was taken by purposive sampling with a total of 100 respondents. The results of the study showed that the HBsAg examination with the highest reactive results in pregnant women aged 26-35 years was 7 respondents and the highest non-reactive HBsAg results in pregnant women aged 26-35 years was 50 respondents. The HBsAg examination with the highest reactive results in pregnant women with high school/vocational school education was 10 respondents and the highest non-reactive HBsAg results in pregnant women with high school/vocational school education was 52 respondents. The HBsAg examination with the highest reactive results in pregnant women who did not work was 10 respondents and the highest non-reactive HBsAg results in pregnant women who did not work was 68 respondents (68%). The highest reactive HBsAg test results were in 10 multigravida pregnant women, and the highest non-reactive HBsAg results were in 57 multigravida pregnant women (57%). The highest reactive HBsAg test results were in 10 first-trimester pregnant women (10%), and the highest non-reactive HBsAg results were in 61 first-trimester pregnant women (61%). Ninety-nine (90%) pregnant women tested for HBsAg had non-reactive results, while 10 respondents (10%) had reactive results.

Keywords: characteristics of pregnant women, HBsAg test