

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin Multigravida di UPTD Puskesmas Patimuan Tahun 2022

Factors Influencing the Incidence of Perineal Rupture in Multigravida Maternity at Patimuan Health Center Year 2022

Reni Dwi Astuti¹, Dwi Maryanti², Frisca Dewi Yunadi³

^{1,2,3}Health Science Al-Irsyad University Cilacap
Jl.Cerme No.24 Sidanegara Cilacap

ABSTRAK

Latar belakang: Ruptur perineum merupakan salah satu penyebab dari perdarahan yang mengakibatkan kematian. Ruptur perineum merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan alat atau tindakan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ruptur perineum meliputi umur ibu, paritas, jarak kehamilan dan berat bayi lahir. **Tujuan:** mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin multigravida. **Metode penelitian:** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian retrospektif. Sampel dalam penelitian ini besarnya sama dengan populasi yaitu sebanyak 105 data. Analisis data menggunakan uji *Spearman rank*. **Hasil:** Berdasarkan uji *spearman rank* didapatkan hasil umur ibu (p -value = 0,014), paritas (p -value = 0,000), berat bayi lahir bayi (p -value = 0,454) dan jarak kehamilan (p -value = 0,150). **Kesimpulan:** Terdapat hubungan umur ibu dan paritas serta tidak terdapat hubungan berat bayi lahir bayi dan jarak kehamilan dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin multigravida di UPTD Puskesmas Patimuan tahun 2022.

Kata Kunci : Ruptur Perineum, umur, paritas, jarak kehamilan dan berat bayi lahir

ABSTRACT

Background: Perineal rupture is one of the causes of bleeding that results in death. Perineal rupture is a tear that occurs when a baby is born either spontaneously or with an instrument or action. Factors associated with the incidence of perineal rupture include maternal age, parity, gestational spacing and birth weight. **Objective:** to determine the factors that influence the incidence of perineal rupture in multigravid mothers. **Research method:** The type of research used in this research is retrospective research. The sample size in this study is the same as the population, namely 105 data. Data analysis used the Spearman rank test. **Results:** Based on the Spearman rank test, the results were obtained for maternal age (p -value = 0.014), parity (p -value = 0.000), birth weight of the baby (p -value = 0.454) and pregnancy interval (p -value = 0.150). **Conclusion:** There is a relationship between maternal age, parity and no relationship between birth weight and gestational spacing with the incidence of perineal rupture in multigravida mothers at the UPTD Patimuan Health Center in 2022.

Keyword : Rupture Perineum, age, parity, gestation interval and birth weight