

**PENERAPAN TINDAKAN TERAPI OKUPASI PEMBUATAN SALE PISANG PADA
KLIEN SKIZOFRENIA DENGAN MASALAH KEPERAWATAN GANGGUAN
SENSORI PERSEPSI HALUSINASI PENDENGARAN
DI PUSKESMAS 2 NUSAWUNGU CILACAP**

Supriyatno¹, Laely Farkhah²

ABSTRAK

Halusinasi pendengaran (suara) adalah gejala paling umum pada skizofrenia. Halusinasi pendengaran berhubungan dengan depresi dan ide bunuh diri pada individu yang mendengar suara yang berdampak buruk pada pasien. Individu dengan halusinasi pendengaran sering menggunakan strategi mengatasi disfungsi ketika mereka mencoba untuk mengelola pengalaman yang tidak menyenangkan seperti berteriak dan bersumpah pada suara-suara sambil mondar-mandir di ruangan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menerapkan implikasi tindakan mandiri keperawatan terapi okupasi pada masalah gangguan persepsi sensori halusinasi. Intervensi pemberian terapi okupasi sebagai bagian dalam strategi pelaksanaan ke-3 dan ke-4 untuk mengontrol halusinasi. Jenis aktivitas fisik yang diintervensi merupakan jenis keterampilan kerja pembuatan makanan yaitu sale pisang. Hasil penerapan intervensi ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki mampu mengontrol dan mengurangi gejala positif dan negatif pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

Kata kunci: halusinasi pendengaran, terapi okupasi.

***IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL THERAPY ACTIONS FOR MAKING BANANA
SALE FOR SCHIZOPHRENIA CLIENTS WITH NURSING PROBLEMS OF SENSORY
PERCEPTION DISORDERS AUDITORY HALLUCINATIONS***

Supriyatno¹, Laely Farkhah²

ABSTRACT

Auditory hallucinations (voices) are the most common symptom in schizophrenia. Auditory hallucinations are associated with depression and suicidal ideation in individuals who hear voices that have a negative impact on the patient. Individuals with auditory hallucinations often use dysfunctional coping strategies when they try to manage unpleasant experiences such as screaming and swearing at voices while pacing around the room. The purpose of this scientific paper is to apply the implications of independent nursing actions of occupational therapy to the problem of sensory perception disorders hallucinations. Interventions for providing occupational therapy as part of the 3rd and 4th implementation strategies to control hallucinations. The type of physical activity that is intervened is a type of food making work skills, namely banana sale. The results of the implementation of this intervention show that physical activity is able to control and reduce positive and negative symptoms in patients with sensory perception disorders auditory hallucinations.

Keywords: auditory hallucinations, occupational therapy.