

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR
RENDAH DAN PENERAPAN ORAL MOTOR EXERCISE DI RUANG PERISTI
RSUD PREMBUN KEBUMEN**

Faatihah RahmaFitria¹, Rusana²

Universitas Al Irsyad Cilacap

Jl. Cerme No. 24, Sidanegara, Cilacap

Email : faatihah84@gmail.com

ABSTRAK

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan kondisi dimana bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa kehamilan. BBLR dengan berat badan 2.500 gram disebut *low birth weight infant* (Bayi Berat Badan Rendah), dikarenakan morbiditas dan mortalitas neonatus tidak hanya bergantung pada berat badan tetapi pada tingkat kematangan (maturitas) bayi tersebut (Pantiawati, 2021). Program stimulasi perioral (struktur luar mulut) dan intraoral (struktur dalam mulut) menjadi salah satu intervensi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menghisap pada bayi BBLR. Metode yang digunakan adalah observasi dengan pendekatan asuhan keperawatan. Hasil evaluasi masalah keperawatan menyusui tidak efektif ditandai dengan peningkatan refleks hisap pada bayi, dikarenakan penerapan stimulasi oral akan mempengaruhi kemampuan minum bayi. Saran, dapat melakukan tindakan mandiri sebagai upaya penurunan tekanan darah secara non farmakologis.

Kata Kunci : Bayi berat badan lahir rendah (BBLR), menyusui tidak efektif, oral motor exercise.

**NURSING CARE FOR INFANTS WITH LOW BIRTH WEIGHT AND
IMPLEMENTATION OF ORAL MOTOR EXERCISE IN THE PERISTI ROOM
at PREMBUN HOSPITAL**

Faatihah RahmaFitria¹, Rusana²

Universitas Al Irsyad Cilacap

Jl. Cerme No. 24, Sidanegara, Cilacap

Email : faatihah84@gmail.com

Low birth weight (LBW) babies are a condition where newborn babies weigh less than 2.500 grams regardless of the gestational period. LBW with a body weight of 2.500 grams is called a low birth weight infant, because neonatal morbidity and mortality does not only depend on body weight but on the maturity level of the baby (Pantiawati, 2021). Perioral (structures outside the mouth) and intraoral (structures inside the mouth) stimulation programs are one of the interventions used to improve the sucking ability of LBW babies. The method used is observation with a nursing care approach. The results of the evaluation of the problem of ineffective breastfeeding nursing were characterized by an increase in the baby's sucking reflex, because the application of oral stimulation would affect the baby's ability to drink. Suggestion, you can take independent action as an effort to lower blood pressure non-pharmacologically.

Keywords: Low birth weight (LBW) babies, ineffective breast feeding, oral motor exercise.

