

**IMPLEMENTASI TERAPI GENERALIS (SP 1-4) HALUSINASI
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN
DI RSUD BANYUMAS**

*Implementation Of Generalist Therapy (Sp 1-4) Hallucinations In Patients With
Schizophrenia With Auditory Hallucinations At Banyumas Hospital*

Injelia¹, Trimeilia Suprihatiningsih²

^{1,2}Universitas Al-Irsyad Cilacap

Jl. Cerme No. 24 Sidanegara Cilacap

Email: liainjelia@gmail.com

ABSTRAK

Di provinsi Jawa Tengah penderita skizofrenia sebanyak 26.842 jiwa. Salah satu tanda gejala *schizophrenia* adalah halusinasi. Halusinasi merupakan suatu bentuk dampak dari gangguan persepsi. Tujuan Penulisan Menggambarkan penerapan tindakan keperawatan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien *schizophrenia* dengan halusinasi pendengaran dan di ruang Arjuna RSUD Banyumas. Metode yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan proses pendekatan keperawatan, sampling yang digunakan meliputi 1 responden. Hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4 kali pertemuan didapatkan hasil perencanaan sesuai dengan perencanaan yang dapat dibuat dengan mengajarkan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien halusinasi pendengaran. Evaluasi yang didapatkan yaitu pasien mampu mengontrol halusinasi, minum obat secara teratur, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas terjadwal.

Kata Kunci : *Schizophrenia*, Halusinasi, Terapi Generalis

ABSTRACT

In Central Java province, there are 26,842 people with schizophrenia. One of the signs of symptoms of schizophrenia is hallucinations. Hallucinations are a form of impact of perceptual disorders. Purpose of Writing Describe the application of generalist therapy nursing (SP 1-4) in schizophrenia patients with auditory hallucinations and in the Arjuna room of Banyumas Hospital. The method used in providing nursing care uses a qualitative method with a case study approach and uses a nursing approach process, the sampling used includes 1 respondent. The results after nursing care for 4 meetings were obtained in accordance with the planning that could be made by teaching generalist therapy (SP 1-4) to auditory hallucination patients. The evaluation obtained was that the patient was able to control hallucinations, take medication regularly, converse and carry out scheduled activities.

Keywords: *Schizophrenia*, Hallucinations, Generalist Therapy