

PENERAPAN PEMBERIAN MADU UNTUK MENGURANGI FREKUENSI DIARE PADA ANAK GASTROENTERITIS AKUT (GEA) DI RSU MEDIKA LESTARI BANYUMAS TAHUN 2025

Reza Ma'lufiana Zuhri, Ida Ariani
Health Science Institute Universitas Al-Irsyad Cilacap
Jl.Cerme No.24 Sidanegara Cilacap

ABSTRAK

Latar belakang: *Gastroenteritis* merupakan defekasi encer lebih dari tiga kali sehari dengan atau tanpa darah dan atau lendir dalam feses. Sedangkan *gastroenteritis* akut (GEA) adalah *gastroenteritis* yang terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 7 hari pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat. **Tujuan:** untuk mengetahui Penatalaksanaan Manajemen diare pada anak dengan GEA di RSU Medika Lestari Banyumas. **Metode:** Jenis studi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Studi ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan Lembar observasi yang terdapat dalam asuhan keperawatan. **Hasil:** pemberian madu 2ml/6jam terhadap pasien anak dengan masalah keperawatan diare efektif memperbaiki masalah eliminasi fekal ditandai dengan penurunan frekuensi BAB dari awal >5 kali dalam sehari menjadi 1 kali dalam 1 hari BAB selama 3 hari pemberian. **Kesimpulan:** pemberian madu 2ml/6jam terhadap pasien anak dengan masalah keperawatan diare efektif memperbaiki masalah diare pada anak. **Kata kunci:** Diare, *Gastroenteritis*, Madu

P

ABSTRACT

Background: *Gastroenteritis* is a loose stool more than three times a day with or without blood and/or mucus in the stool. Acute *gastroenteritis* (GEA) occurs suddenly and lasts less than 7 days in infants and children who were previously healthy. **Objective:** to determine the Management of diarrhea in children with GEA at RSU Medika Lestari Banyumas. **Method:** The type of study used is quantitative research. This study uses a descriptive method. Data collection uses an observation sheet contained in nursing care. **Results:** giving honey 2ml/6 hours to pediatric patients with diarrhea nursing problems effectively improves fecal elimination problems marked by a decrease in the frequency of bowel movements from the beginning >5 times a day to 1 time in 1 day for 3 days of administration. **Conclusion:** giving honey 2ml/6 hours to pediatric patients with diarrhea nursing problems effectively improves diarrhea problems in children. **Keywords:** Diarrhea, *Gastroenteritis*, Honey