

IMPLEMENTASI TERAPI GENERALIS HALUSINASI (SP 1-4) PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN DAN PENGLIHATAN DI BANGSAL NUSA INDAH RSUD PREMBUN

Implementation of Generalized Hallucinations Therapy (SP 1-4) In Schizophrenia Patients With Auditory And Visual Halucinations In Nusa Indah Ward, Prembun Hospital

Fandi Rahmanto¹, Trimeilia Suprihatiningsih²

^{1,2,3}University of Al-Irsyad Cilacap Jl. Cerme No.24 Sidanegara Cilacap

^{*}fandirahmanto100@gmail.com

ABSTRAK

World Health Organization, (2022), tahun 2018 memperkirakan terdapat sekitar 450 juta orang didunia terkena schizophrenia. Salah satu tanda gejala schizophrenia adalah halusinasi. Halusinasi merupakan suatu bentuk dampak dari gangguan persepsi. Tujuan penulisan adalah menggambarkan penerapantindakan keperawatan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien schizophrenia dengan halusinasi pendengaran dan penglihatan di Bangsal Nusa Indah RSUD Ajibarang. Metode yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan proses pendekatan keperawatan, sampling yang digunakan meliputi 1 responden. Hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali pertemuan didapatkan hasil perencanaan sesuai dengan perencanaan yang dapat dibuat dengan mengajarkan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien halusinasi pendengaran dan penglihatan. Evaluasi yang didapatkan yaitu pasien mampu mengontrol halusinasi, minum obat secara teratur, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas terjadwal.

Kata Kunci : *Schizophrenia, Halusinasi, Terapi Generalis*

ABSTRACT

The World Health Organization, (2022), in 2018 estimates that there are around 450 million people in the world affected by schizophrenia. One of the signs of schizophrenia is hallucinations. Hallucinations are a form of impact of perception disorders. The purpose of this writing is to describe the application of generalist therapeutic nursing actions (SP 1-4) in schizophrenia patients with auditory and visual hallucinations in the Nusa Indah Ward of Ajibarang Regional Hospital. The method used in providing nursing care uses a qualitative method with a case study approach and uses a nursing approach process, the sampling used includes 1 respondent. The results after nursing care was carried out for 3 meetings showed that the planning results were in accordance with the plans that could be made by teaching generalist therapy (SP 1-4) to patients with auditory and visual hallucinations. The evaluation obtained was that the patient was able to control hallucinations, take medication regularly, carry out conversations and carry out scheduled activities.

Keywords: *Schizophrenia, Hallucinations, Generalist Therapy*