

HALAMAN ABSTRAK

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT DI PUSKESMAS PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

Ayu Megasari

Program Studi S1 Farmasi

Universitas Al-Irsyad Cilacap

ABSTRAK

Prevalensi gangguan jiwa diseluruh dunia data WHO pada tahun 2019, terdapat 264 juta orang mengalami depresi 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang mengalami demensia, dan 20 juta orang mengalami skizofrenia. Dampak skizofrenia sangat besar yaitu menimbulkan beban bagi masyarakat serta keluarga karena memerlukan biaya perawatan yang besar, kehilangan waktu produktif. Penatalaksanaan skizofrenia merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan terapi. Ketidapatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan dapat menyebabkan kekambuhan yang akan dialami oleh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga pasien skizofrenia dengan tingkat kepatuhan minum obat di Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif korelasi. Sampel penelitian berjumlah sebanyak 197 pasien skizofrenia usia 17-45 tahun yang dipilih secara *consecutive sampling* dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data bivariat menggunakan uji *spearman rho*. Hasil menunjukkan tingkat kepatuhan mayoritas responden dengan pengetahuan tentang skizofrenia dengan kategori baik yaitu sejumlah 84 responden (42.6%). Tingkat kepatuhan minum obat mayoritas pasien skizofrenia dengan kategori sedang yaitu sejumlah 124 responden (62.9%). Penelitian ini menyimpulkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga pasien skizofrenia dengan tingkat kepatuhan minum obat di Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen dengan *Korelasi Spearman* $r = 0.456$ dengan $p = 0.000$ ($p < 0,05$).

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Pasien Skizofrenia, Tingkat Kepatuhan

Minum Obat

HALAMAN ABSTRACT

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT DI PUSKESMAS PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

Ayu Megasari

Program Studi S1 Farmasi

Universitas Al-Irsyad Cilacap

ABSTRACT

The prevalence of mental disorders worldwide according to WHO data in 2019, there are 264 million people experiencing depression, 45 million people suffer from bipolar disorder, 50 million people have dementia, and 20 million people have schizophrenia. The impact of schizophrenia is very large, namely it creates a burden on society and families because it requires large treatment costs, and loses productive time. Management of schizophrenia is one of the main factors that influence the success of therapy. Patient non-compliance in carrying out treatment can cause recurrence that will be experienced by patients. This study aims to determine the relationship between the level of family knowledge of schizophrenic patients and the level of adherence to taking medication at the Pejagoan Health Center, Kebumen Regency. This research method is quantitative correlation. The research sample consisted of 197 schizophrenic patients aged 17-45 years who were selected by consecutive sampling with inclusion and exclusion criteria. Bivariate data analysis using the Spearman rho test. The results show that the level of compliance of the majority of respondents with knowledge of schizophrenia is in the good category, namely 84 respondents (42.6%). The level of adherence to taking medication for the majority of schizophrenia patients was in the moderate category, namely 124 respondents (62.9%). This study concluded that there was a relationship between the level of knowledge of schizophrenic patients and the level of medication adherence at the Pejagoan Health Center, Kebumen Regency, with Spearman's correlation $r = 0.456$ with $p = 0.000$ ($p < 0.05$).

Keywords: Level of Knowledge, Schizophrenia Patients, Medication Compliance Level