

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Laporan Tugas Akhir, Juli 2023

Anita Sari

Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir (BBL) Ny.S Usia 0 Jam Dengan Asfiksia Berat di Ruang Perinatologi RSI Fatimah Cilacap.

xiii halaman + 89 halaman + 16 lampiran + 2 bagan + 1 tabel

ABSTRAK

Latar Belakang: Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah ibu yang mengalami preeklamsia dan eklamsia, pendarahan abnormal, partus lama atau partus macet (Kala II lama), kehamilan postmatur, usia ibu, persalinan sulit, air ketuban bercampur mekonium, lilitan tali pusat, prolaps tali pusat. Angka kejadian asfiksia di RSI Fatimah Cilacap pada tahun 2021 sebanyak 42 kasus dan di tahun 2022 sebanyak 41 kasus.

Metode: Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dengan penerapan manajemen varney meliputi Pengumpulan Data, Interpretasi Data, Diagnosa Potensial dan antisipasi, Tindakan segera, Rencana Tindakan, Pelaksanaan, Evaluasi dan catatan perkembangan dalam bentuk SOAP.

Hasil: Kasus Asuhan Kebidanan Pada BBL.Ny.S Usia 0 Jam Dengan Asfiksia Berat di Ruang Perinatologi RSI Fatimah Cilacap dianalisis menggunakan manajemen Varney dengan masalah pemenuhan oksigen yang tidak adekuat maka diperlukan pemberian oksigenasi.

Kesimpulan: Berdasarkan apa yang didapatkan penulis mengidentifikasi terdapat kesenjangan teori dan praktek yaitu pada penentuan diagnosa potensial.

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan, Bayi Baru Lahir, Asfiksia Berat

Daftar Pustaka : 33 Buah (2015-2022)

DIPLOMA III MIDWIFE STUDY PROGRAM

AL-IRSYAD UNIVERSITY, CILACAP

Final Project Report, Juli 2023

Anita Sari

Midwifery Care for Newborn (BBL) Ny.S Aged 0 Hours With Severe Asphyxia in the Perinatology Room of RSI Fatimah Cilacap.

xiii pages + 89 pages + 16 attachment + 2 chart + 1 table

ABSTRACT

Background: Neonatal asphyxia is failure to breathe spontaneously and regularly at birth or some time after birth. The causes of asphyxia in a newborns are mothers who experience preeclampsia and eclampsia, abnormal bleeding, prolonged labor or macerated labor (long second stage), postmature pregnancy, maternal age, difficult labor, amniotic fluid mixed with meconium, umbilical cord twists, prolapse of the umbilical cord. The incidence of asphyxia at Fatimah Cilacap Hospital in 2021 is 42 cases and in 2022 there are 41 cases.

Methods: Descriptive research with a case study approach (Case Study) with the application of varney management Includes Data Collection, Data Interpretation, Potential Diagnosis and Anticipation, Immediate Action, Action Plan, Implementation, Evaluation and progress notes in SOAP.

Result: Cases of Midwifery Care at BBL.Ny.S Age 0 Hours with Severe Asphyxia in the Perinatology Room of RSI Fatimah Cilacap were analyzed using Varney's management with problems of inadequate oxygen fulfillment, so oxygenation is needed.

Conclusion: Based on what was obtained, the authors identified that there was a gap between theory and practice, namely in determining potential diagnoses.

Keyword: Midwifery Care, Newborn, Severe Asphyxia

Bibliography: 32 pieces (2015-2022)