

PENERAPAN TINDAKAN KEPERAWATAN TERAPI GENERALIS (SP 1-4) PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN DAN PERABAAN DI RUANG BIMA RSUD BANYUMAS

*Implementation Of Nursing Actions General Therapy (SP 1-4) In Schizophrenia
Patients With Auditory And Tactile Hallucinations In The Bima Room Of
Banyumas Hospital*

Kharisma Wijhatul Amalina¹, Trimelia Suprihatiningsih²
Universitas Al-Irsyad Cilacap
Jl.Cerme No.24, Sidanegara, Cilacap
Email : kharismawijhatulamalina2@gmail.com

ABSTRAK

Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, merasakan, dan mengekspresikan emosi, serta gangguan otak yang ditandai dengan pikiran yang tidak teratur, delusi, halusinasi, dan perilaku aneh. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengelolaan asuhan keperawatan pada penderita Halusinasi Pendengaran dan Perabaan dengan penerapan tindakan Generalis (SP 1- SP 4) di Ruang Bima RSUD Banyumas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan proses keperawatan. Sampel yang digunakan sebanyak 1 responden. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh bahwa terjadi peningkatan kemampuan klien dalam mengontrol halusinasi yaitu dengan cara menghardik, patuh minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas terjadwal.

Kata Kunci : Skizofrenia, Halusinasi, Terapi Generalis

ABSTRACT

Schizophrenia is a group of psychotic reactions that affect various areas of an individual's functioning, including thinking, communicating, feeling, and expressing emotions, as well as brain disorders characterized by disorganized thinking, delusions, hallucinations, and strange behavior. The aim of this research is to describe the management of nursing care for sufferers of auditory and tactile hallucinations by applying generalist measures (SP 1-4) in the Bima Room at Banyumas Hospital. This research is a type of qualitative research with a case study approach and the nursing process. The sample used was 1 respondent. The results of the research showed that there was an increase in the client's ability to control hallucinations, namely by reprimanding them, complying with taking medications, and carrying out scheduled activities.

Keywords : Schizophrenia, Hallucinations, Generalist Therapy