

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN ULKUS KAKI
DIABETIK DENGAN MASALAH KEPERAWATAN ANSIETAS DAN
PENERAPAN TERAPI MUROTTAL AL-QURAN DI RUANG ANGGREK
RSUD PREMBUN**

**Studi Mengenai Masalah Keperawatan Ansietas dan Penerapan Terapi
Murottal Al-Quran Pada Pasien Dengan Ulkus Kaki Diabetik Di Ruang
Anggrek RSUD Prembun**

*NURSING CARE FOR PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERS WITH
ANXIETY NURSING PROBLEMS AND THE APPLICATION OF MUROTTAL AL-
QURAN THERAPY IN THE ORCHID ROOM OF PREMBUN HOSPITAL
Study on Anxiety Nursing Problems and the Application of Murottal Al-Quran
Therapy in Patients with Diabetic Foot Ulcers in the Orchid Room of Prembun
Hospital*

Zakkia Zahra Devaani, Engkartini

University of Al-Irsyad Cilacap
Jl. Cermas No. 24 Sidanegara Cilacap
zakkiyahidayat@gmail.com

ABSTRAK

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis yang disebabkan karena adanya gangguan metabolik sehingga kadar gula darah tidak normal. Salah satu tipe penyakit DM yaitu ulkus kaki diabetik dimana kaki terdapat ulkus, infeksi, dan atau kerusakan dari jaringan, yang berhubungan dengan kelainan neurologi dan penyakit pembuluh darah perifer pada ekstremitas bawah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan asuhan keperawatan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel pada penelitian ini adalah 1 responden. Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner HARS (*Hamilton Anxiety Rating*). Pemberian terapi dilakukan 3 kali shift. Durasi 1 kali 15 menit. Hasil penelitian menunjukkan kecemasan pada pasien Diabetes Melitus dilakukan intervensi terapi murottal yaitu terdapat penurunan skor kecemasan 28 menjadi 18 dimana memberikan terapi Murottal Al-Qur'an dapat menurunkan tingkat ansietas pada pasien ulkus kaki diabetik.

Kata Kunci: Ulkus kaki diabetik, terapi murottal Al-Qur'an, Ansietas

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease caused by metabolic disorders resulting in abnormal blood sugar levels. One type of DM disease is diabetic foot ulcers where the feet have ulcers, infection, and/or tissue damage, which is associated with neurological disorders and vascular disease. peripheral blood in the lower extremities. Data collection was carried out by providing nursing care with interviews, observation and documentation. The sample in this study was 1 respondent. The measuring tool used is the HARS (*Hamilton Anxiety Rating*) questionnaire. Therapy was given in 3 shifts. Duration 1 time 15 minutes. The results of the study showed that anxiety in Diabetes Mellitus patients underwent Murottal therapy intervention, namely there was a decrease in anxiety scores from 28 to 18 where providing Murottal Al-Qur'an therapy could reduce the level of anxiety in diabetic foot ulcer patients.

Keywords: Diabetic foot ulcer, Qur'anic murottal therapy, Ansietas

