

GAMBARANKUALITAS HIDUP PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI RSU RAFFA MAJENANG

Overview Of The Quality Of Life Pulmonary Tuberculosis Patients At Raffa majenang Hospitals

Novita Dewi Indriani¹, Sutarno², Sodikin³

^{1,2,3} Health Science Institute Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Jl. Cerme No. 24 Sidanegara Cilacap

ABSTRAK

Tuberculosis adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis* atau biasa disebut dengan kuman TB. Kualitas Hidup atau *Quality Of Life* merupakan suatu ukuran untuk menilai dampak dari suatu pengobatan yang dilakukan oleh pasien yang memiliki penyakit kronik. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan kualitas hidup pasien Tuberkulosis Paru di RSU Raffa Majenang. Desain penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan *cross sectional*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 pasien tuberkulosis dan menggunakan instrumen WHOQOL untuk mengukur kualitas hidup pasien. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas hidup pasien TB paru sebanyak (54,07%) memiliki kualitas hidup yang sedang, yang tercermin dari 23 pasien yang termasuk dalam kategori ini, sebanyak (40,70%) atau 17 pasien masuk kedalam kategori baik, sebanyak (4,65%) atau 2 pasien masuk kedalam kategori sangat baik dan sebanyak (0,58%) atau 1 pasien masuk kedalam kategori kualitas hidup yang buruk. Kesimpulan pasien TB Paru yang dalam masa pengobatan memiliki kualitas hidup sedang. Saran, kualitas hidup dapat dibentuk dengan mencari dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok dukungan juga dapat membantu mengatasi tantangan psikologis dan sosial yang dihadapi.

Kunci : Kualitas hidup, dimensi kualitas hidup

ABSTRACT

*WHOQOL instrument to measure the patient's quality of life. The results of the research analysis showed that the majority of pulmonary TB patients' quality of life (54.07%) had a moderate quality of life, which was reflected in the 23 patients who were included in this category, as many as (40.70%) or 17 patients were in the good category., as many as (4.65%) or 2 patients were in the very good category and as many as (0.58%) or 1 patient were in the poor quality of life category. Conclusion: Pulmonary Tuberculosis patients undergoing treatment have a moderate quality of life. Suggestions, quality of life can be established by seeking support from family, friends and support groups which can also help overcome the psychological and social challenges faced.Tuberculosis is a disease that attacks the respiratory tract caused by *Mycobacterium Tuberculosis* bacteria or commonly known as TB germs. Quality of Life is a measure to assess the impact of treatment carried out by patients who have chronic diseases. The aim of this study was to describe the quality of life of Pulmonary Tuberculosis patients at Raffa Majenang Hospitals. This research design is descriptive using a cross sectional approach. The number of samples in this study was 43 tuberculosis patients and used the*

Keyword: *Quality of life, dimensions of quality of life*